


ULOTKA INFORMACYJNA

FETTENTFERNER 0505



Produkt do zastosowań profesjonalnych

Właściwości i zakres stosowania

Płynny niepianowy preparat o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych przeznaczony do mycia i dezynfekcji w systemie obiegowym instalacji technologicznych, zbiorników oraz pojemników plastikowych w myjkach automatycznych.

Sposób użycia

Stężenie: 0,3-1,5%

Temperatura: 20-55°C

Czas działania:- bakteriobójczego: 5-20 minut

-grzybobójczego: 15-30 minut

Warunki stosowania w myjkach pojemników:

-temperatura: 50°C

-czas działania: 30-60 sekund

-stężenie: 0,3 - 1,0%

Po zastosowaniu myte powierzchnie oraz sprzęt służący do wykonywania zabiegów spłukać wodą pitną.

Stężenie skuteczne produktu względem bakterii i grzybów przez 6-miesięczny okres ważności w czasie kontaktu 15min., w temp. 20°C wynosi 0,3%.

Czas wentylacji

Nie dotyczy. Środek przeznaczony do mycia i dezynfekcji w układach zamkniętych.

Skład

Substancja czynna: 34 g/ 100 g podchlorynu sodu; wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu.

Dane techniczne

Wygląd Żółta, klarowna ciecz

pH (roztwór 1% w 20°C) 12,33

Zawartość azotu: BRAK

Zawartość fosforu: 1,2 g/ litr

Przechowywanie

Magazynowanie w pomieszczeniach z dobrą wentylacją, w temp. +10°C do +25°C. Chronić przed działaniem promieniowania słonecznego i ciepła.

Postępowanie z odpadami

Puste opakowania zwrócić dostawcy. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby stężonym preparatem. W przypadku niezamierzonego wycieku, preparat rozcieńczyć.

Właściwości biobójcze

1.Działanie bakteriobójcze na powierzchniach zgodnie z normą PN-EN 13697:2001 w czasie 5 minut w temperaturze 20°C w warunkach brudnych w stężeniu 0,3% w wodzie twardej.

2.Działanie grzybobójcze na powierzchniach zgodnie z normą PN-EN 13697:2001 w czasie 15 minut w temperaturze 20°C w warunkach brudnych w stężeniu 0,3% w wodzie twardej.

3.Działanie bakteriobójcze zgodnie z normą PN-EN 1276:2000 w czasie 5 minut w temperaturze 20°C w warunkach brudnych w stężeniu 0,3% w wodzie twardej.

4. Działanie grzybobójcze zgodnie z normą PN-EN 1650:1997 w czasie 15 minut w temperaturze 20°C w warunkach brudnych w stężeniu 0,3% w wodzie twardej.

5.Działanie biobójcze na bakterie *Listeria monocytogenes* ATCC 7644, *Salmonella enterica* ATCC 13311, *Escherichia coli* ATCC 7644 zgodnie z normą PN-EN 1276:2000/ Ap1:2001 w czasie 30 sekund w temperaturze 50°C w warunkach brudnych w stężeniu 0,3% w wodzie twardej

6.Działanie biobójcze na grzyby *Candida albicans* ATCC 10231 zgodnie z normą PN-EN 1650:2008 w czasie 30 sekund w temperaturze 50°C w warunkach brudnych w stężeniu 0,3% w wodzie twardej.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym

4297/10

Atest NIZP-PZH

HŻ/4272/2009

Pierwsza pomoc

Informacje odnośnie udzielania pierwszej pomocy znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu. W razie kontaktu oczy i skórę przemyć wodą. W przypadku zatrucia drogą oddechową zapewnić dostęp świeżego powietrza. Po połknięciu natychmiast wypłukać jamę ustną, a następnie wypić dużą ilość wody. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.



10.06.2014

KUCHNIE ŚWIATA S.A.

01-708 WARSZAWA ul. Słodowiec 10/10

tel.(22)7859561

www.sanechem.com.pl